

Liebe Patientin, lieber Patient,

bei Ihnen wurde eine Operation zur Straffung des Gaumens durchgeführt. Da es sich um eine Operation im Bereich des Rachens handelt, kann es nach der Operation zu Schmerzen bei der Nahrungsaufnahme und beim Schlucken kommen.

Folgende Medikamenteneinnahme hat sich bewährt, daher bitten wir Sie, folgende Medikamente laut Plan einzunehmen:

## **BASISMEDIKATION**

- Ibuprofen 400 mg | 3x1 Filmtablette
- Dolo Dobendan® Lutschtabletten | bis zu 5x täglich

Sollte es dadurch zu keiner ausreichenden Schmerzstillung kommen, empfehlen wir eine stufenweise Erhöhung der Medikation mit den nachfolgend genannten Medikamenten in folgender Reihenfolge:

- Paracetamol | 4x täglich
- Novaminsulfon-Tropfen | 3x 20-25 Tropfen
- TRAMAL® long bei starken Schmerzen (1x morgens | 1x nachts)
- Antibiose wie vom Arzt verordnet

Nach jeder Nahrungsaufnahme empfehlen wir, mit klarem Wasser oder Bepanthen® Mundspüllösung zu spülen.

**PD DR MED UNIV ILONA SCHWENTNER**  
FACHÄRZTIN FÜR HALS-NASEN-OHRENHEILKUNDE  
INFO@HNO-BOEBLINGEN.DE | HNO-BOEBLINGEN.DE

## **STANDORTE**

BÖBLINGEN | POSTSTRASSE 6 | 71032 BÖBLINGEN | T 07031 221100  
HERRENBERG | BAHNHOFSTRASSE 17 | 71083 HERRENBERG | T 07032 24288